

## PAKKAUSSELOSTE

### Mobilat® geeli

Vaikuttavat aineet: lisämunuaisen kuorikerroksen uute  
(kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo

#### **Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Mobilat-geeliä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieviy.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

#### **Tässä pakkausselosteessa esitetään:**

1. Mitä Mobilat on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Mobilat-geeliä
3. Miten Mobilat-geeliä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mobilat-geelin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

#### **1. MITÄ MOBILAT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN**

Mobilat-geeli on kolmen lääkeaineen yhdistelmävalmiste.

Mobilat-geelin vaikuttavat aineet imeytyvät jonkin verran ihon läpi alla oleviin kudoksiin. Ne estävät tulehdusreaktioita ja edistävät turvotuksen häviämistä, jolloin kipu lievittyy. Mobilat-geeli ei ärsytä ihoa. Geelillä on miellyttävä ihoa viilentävä vaikutus.

#### **Mobilat-geeliä käytetään**

- lihas- ja nivelsäryn paikallishoitoon.

#### **2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MOBILAT-GEELIÄ**

##### **Älä käytä Mobilat-geeliä**

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai jollekin muulle Mobilat-geelin aineosalle
- jos sinulla on vesirokko, rokotusreaktioita tai ihon sieni- ja bakteeri-infektioita.

##### **Ole erityisen varovainen Mobilatin suhteen**

- Hoidettaessa pitkiä aikoja suuria ihoalueita munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tulee saavutettava hyöty haittoihin verrattuna harkita huolellisesti.

Geelin sisältämän alkoholin (isopropanoli) vuoksi on varottava sen joutumista rikkoutuneelle iholle, avoimiin haavoihin, silmiin tai limakalvoille, joissa se aiheuttaa kirvelyä.

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Jos oire jatkuu Mobilat-hoidosta huolimatta, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.

### **Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Mobilat-geeli sisältää salisyylihappoa, joka voi lisätä ihon läpäisevyyttä muille samaan kohtaan käytetyille lääkkeille.

### **Raskaus ja imetys**

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Raskauden aikana Mobilat-geeliä ei pidä käyttää suurilla ihoalueilla. Mobilat-geeliä ei pidä käyttää rintojen alueella.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Ei tunnettuja vaikutuksia.

### **Tärkeää tietoa Mobilat-geelin sisältämistä aineista**

Propyleeniglykoli: voi aiheuttaa ihoärsytystä.

## **3. MITEN MOBILAT-GEELIÄ KÄYTETÄÄN**

Käytä Mobilat-geeliä juuri sen verran kuin tässä pakkausselosteessa esitetään. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Mobilat-geeliä sivellään hoidettavalle ihoalueelle useita kertoja päivässä, ellei lääkäri toisin määrää.

Mobilat-geelin käyttöä okklusiosidosten alla tulee välttää.

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

### **Jos käytät enemmän Mobilat-geeliä kuin sinun pitäisi**

Annostustavan vuoksi äkillisen yliannostuksen vaara on erittäin epätodennäköinen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET**

Kuten kaikki lääkkeet, Mobilatkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavaa luokitusta käytetään arvioitaessa haittavaikutusten yleisyyttä:

**Harvinainen** (esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta):

Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä paikallista ihoärsytystä.

**Hyvin harvinainen** (esiintyy harvemmin kuin yhdellä 10 000:sta käyttäjästä):

Yksittäisissä tapauksissa voi esiintyä kosketusallergiaa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

## **5. MOBILAT-GEELIN SÄILYTTÄMINEN**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Mobilat-geeliä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytetään huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. MUUTA TIETOA**

### **Mitä Mobilat sisältää**

Vaikuttavat aineet ovat lisämunuaisen kuorikerroksen uute (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo.

1 g geeliä sisältää lisämunuaisen kuorikerroksen uutetta 10,0 mg (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaattia 2,0 mg, salisyylihappoa 20,0 mg.

### ***Muut aineet ovat:***

Isopropyylialkoholi, karbomeeri, etanoliamiini, natriumedetaatti, propyleeniglykoli, rosmariiniöljy, puhdistettu vesi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Läpinäkyvä, opaalinhohtoinen, väritön tai hieman ruskehtava, 2-propanolin ja rosmariiniöljyn tuoksuinen geeli, joka ei sisällä näkyviä kasaumia tai partikkeleita.

Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g ja 100 g.

### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

#### ***Myyntiluvan haltija***

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Saksa

#### ***Valmistajat***

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Saksa.

ja

Mobilat Produktions GmbH  
Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Saksa

#### ***Lisätietoja antaa***

Oy STADA Pharma Ab, 00100 Helsinki, Suomi

**Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi**  
8.12.2009